




HPV

źródło fot.pulsmedycyny.pl

Co to jest wirus HPV?

HPV (Human Papilloma Virus) jest nazwą ludzkiego wirusa brodawczaka.



Wirus ten charakteryzuje się wysokim stopniem zakaźności.

Co to jest wirus HPV?

Wg danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) aż **80%** aktywnych seksualnie kobiet bezpośrednio styka się w ciągu swego życia z tym wirusem.




Z badań wynika, że obecnie na świecie ok. **15-20%** populacji jest zakażona wirusem HPV.

50% z nich to kobiety i mężczyźni między **15-25 rokiem życia**.

Dlaczego wirus HPV jest groźny dla człowieka?

Wirus brodawczaka ludzkiego to **powszechnie występujący** wirus, atakujący zarówno kobiety jak i mężczyzn.


Jest odpowiedzialny za powstawanie **brodawek**, zmian skórnych tzw. **kłykcin** oraz **chorób nowotworowych**.



Dlaczego wirus HPV jest groźny dla człowieka?

Istnieje ok **200 typów** tego wirusa.

Typ 16 oraz **18** wywołuje aż **70%** zakażeń, które prowadzą do zmian nowotworowych, m.in. raka szyjki macicy (RSM).



Rocznie pojawia się ponad **3000** nowych przypadków RSM w Polsce.

Każdego roku z powodu RSM umiera ok. **1700** Polek.

Jak można zarazić się wirusem HPV?

Jedynym źródłem zakażenia jest człowiek.



Zakażenia przenoszone są **drogą płciową** lub poprzez kontakt skóry **zainfekowanej** wirusem HPV ze skórą zdrową.

Jak można zarazić się wirusem HPV?

Ryzyko zakażenia występuje od chwili inicjacji seksualnej.



Wg badań zakażeniu ulega **20% młodzieży** w ciągu **1 roku** od rozpoczęcia aktywnego życia seksualnego.

50 % zarazi się w ciągu pierwszych **2 lat** od inicjacji.

Jak skutecznie zabezpieczyć się przed wirusem HPV?

Nie istnieje lek zwalczający wirusa po zarażeniu się nim!



Tylko **profilaktyka** szczepienna **chroni** przed wirusem HPV.

Jak skutecznie zabezpieczyć się przed wirusem HPV?

Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego podawana jest w dwu schematach :

Wariant pierwszy czyli **2 dawki** w odstępie od 5 do 13 miesięcy.
Wariant drugi czyli **3 dawki**.



Źródło fot. pl.freepik.com

Drugie wstrzyknięcie 2 miesiące po pierwszym wstrzyknięciu
(nie wcześniej niż po upływie jednego miesiąca od daty
podania pierwszej dawki)

Trzecie wstrzyknięcie: 6 miesięcy po pierwszym wstrzyknięciu.

Profilaktyka zakażeń wirusem HPV

Szczepionka podawana jest domięśniowo w **2** lub w **3** dawkach w ciągu **6 miesięcy**.



Szczepionkę można podać **dziewczynkom** i **chłopcóm** po ukończeniu **9 roku** życia.

Profilaktyka zakażeń wirusem HPV

Liczne badania kliniczne prowadzone dla istniejącej od **2006** r. szczepionki przeciw wirusowi HPV udowodniły jej **skuteczność** oraz bezpieczeństwo.

Szczepionkę **refunduje** ponad 70 państw.

Stosowana jest w ponad **130** krajach **na świecie**.



Szczepionka przeciwko wirusowi HPV **daje** długą i wieloletnią **odporność**.



Pamiętajmy, że zapobieganie chorobie jest o wiele lepsze od jej leczenia.

Dziękujemy za uwagę.

Grupa Medyczna TOMMED



Profilaktyka i promocja zdrowia w ramach
„Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego(HPV) w mieście
Katowice”



KATOWICE
dla odmiany

*Program jest w całości finansowany ze
środków budżetu miasta Katowice.*

